

Date of prep: February 2025

Job number: FI-ZI-2400035

Job name: Zyrtec FI: website Products subpage



This material is part of the redesign of the Zyrtec.fi website. All the pages (home page and subpages) have their own document approval number. While reviewing this material, please note that the website as a whole is part of the redesign. Specific changes will be noted on each material separately.

After final approval, the current website will be replaced with the new website (www.zyrtec.fi)

The pages included in the redesign are:

1. Home page
2. The Products subpage
3. Hints & Tips
4. Articles subpage
5. Zyrtec comics subpage
6. Terms of use and Privacy policy
7. Cookie banner and Cookie policy
8. Community rules
9. Footer



Tuotteet

Zyrtec® on allergialääke, jonka vaikuttava aine on **setiritsiini**dihydrokloridi. Antihistamiini on tarkoitettu kausiluontoiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyvien nenä- ja silmäoireiden lievitykseen sekä nokkosihottuman (kroonisen idiopaattisen urtikarian) oireiden hoitoon. Tutustu pakkausselosteeseen ennen lääkkeen käyttöä.

ZYRTEC® tabletti

- Tabletit on tarkoitettu aikuisille ja vähintään 6-vuotiaille lapsille.
- Tabletin voi jakaa kahteen yhtä suureen annokseen.
- Pakkauskoot: 10 ja 30 tablettia.

Annostus ja lääkkeen ottaminen	>
Huomioitavaa lääkkeen käytössä	>
Haittavaikutukset	>



ZYRTEC® oraaliliuos 1 mg/ml

- Oraaliliuos on tarkoitettu aikuisille ja vähintään 2-vuotiaille lapsille.
- Liuos voidaan ottaa sellaisenaan. Mittalusikka sisältyy pakkaukseen.
- Pakkauskoko: pullo 75 ml.

Annostus ja lääkkeen ottaminen	>
Huomioitavaa lääkkeen käytössä	>
Haittavaikutukset	>



ZYRTEC® 10 mg/ml tipat

- Tipat on tarkoitettu aikuisille ja vähintään 2-vuotiaille lapsille.
- Tipat annostellaan lusikkaan tai sekoitetaan veteen.
- Pakkauskoko: pullo 20 ml.

Annostus ja lääkkeen ottaminen	>
Huomioitavaa lääkkeen käytössä	>
Haittavaikutukset	>



Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55 00034 FIMEA

2/2025, FI-ZI-2400035



Zyrtec, 10 mg tabletit, 1 mg/ml oraaliliuos, 10 mg/ml tipat.

Vaikuttava aine: setiritsiini

dihydrokloridi. Käyttöaihe: Kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyvien nenä- ja silmäoireiden lievittämiseen sekä pitkäaikaisen nokkosihottuman oireiden hoitoon. Annostus ja antotapa: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat: 1 tabletti tai 20 tippaa tai 10 millilitraa kerran vuorokaudessa. Lapset 6–12 vuotta: puoli tablettia tai 10 tippaa tai 5 millilitraa kaksi kertaa vuorokaudessa. Lapset 2–6 vuotta: 5 tippaa tai 2,5 millilitraa kaksi kertaa vuorokaudessa. Ota tabletit veden kera, liuos sellaisenaan, tipat voidaan ottaa sellaisenaan tai sekoittaa veteen. Vasta-aiheet ja varoitukset: Älä käytä Zyrtec-valmistetta, jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, tai jos olet yliherkkä Zyrtec-valmisteen jollekin ainesosalle, tai hydroksiitsiinille, tai piperatsiinijohdoksille. Ole erityisen varovainen, jos sinulla on virtsaamisvaikeuksia tai epilepsia. Varmista lääkkeen sopivuus lääkäritäsi, jos olet raskaana tai imetät, tai jos sinulla on jokin sokeri-intoleranssi. Yleisimmät haittavaikutukset: Uneliaisuus, uupumus, heitehuimaus, päänsärky, nielutulehdus, nuha (lapsilla), pahoinvointi, vatsakipu, ripuli (lapsilla), suun kuivuminen. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi apteekista. Tutustu pakkausselosteeseen. Markkinoija: UCB Pharma Oy Finland, puh. 09-2514 4221, ucb.finland@ucb.com Perustuu 13.6.2022 (tabletti); 31.8.2023 (tipat); 10.10.2023 (liuos) päivittyyn valmisteyhteenvetoon.

Kysyttävää UCB:n lääkevalmisteista? Ota yhteyttä:
0800 9 13353 (maksuton numero)
+358 9 4273 3300 (maksullinen numero)
UCBCares.FI@ucb.com
www.ucbcares.fi




Käyttöehdot | Evästeiden käyttö | Tietosuojakäytäntö

Evästeasetukset >

2/2025, FI-ZI-2500005



Zyrtec® tabletti tabs opened

**ZYRTEC®** tabletti

- Tabletit on tarkoitettu aikuisille ja vähintään 6-vuotiaille lapsille.
- Tabletin voi jakaa kahteen yhtä suureen annokseen.
- Pakkauskoot: 10 ja 30 tablettia.

Annostus ja lääkkeen ottaminen

- Ota lääkettä pakkaukselosteen ohjeiden mukaisesti tai kuten lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
- Aikuisille ja yli 12-vuotiaille suositeltu annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa.
- 6–12-vuotiaille suositeltu annos on puolikas tabletti kaksi kertaa vuorokaudessa.
- Tabletin voi jakaa kahteen yhtä suureen annokseen.
- Voidaan ottaa ruokailusta riippumatta.
- Runsasta alkoholin käyttöä lääkityksen yhteydessä tulisi välttää.

Huomioitavaa lääkkeen käytössä

Munuaisten vajaatoiminta:

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Zyrtec-valmistetta, jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta. Älä ota valmistetta, jos sinulla on vaikea dialyysihoidoa vaativa munuaissairaus.

Raskaus ja imetys:

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lääkkeen käyttöä raskausaikana on vältettävä. Lääkkeen tahattoman raskaudenaikaisen käytön ei pitäisi vaikuttaa sikiöön haitallisesti. Tästä huolimatta tätä lääkettä tulisi käyttää vain tarvittaessa ja lääkärin kehotuksesta.

Setiritsiini erittyy rintamaitoon, joten älä käytä lääkettä imetyksen aikana ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.

Vaikuttava aine ja muut aineet:

Älä ota Zyrtec-valmistetta, jos olet allerginen setiritsiinidihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle.

Muut lääkkeet:

Ilmoita lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät parhaillaan, olet äskettäin käyttänyt tai suunnittelet käyttäväsi muita lääkkeitä.

Haittavaikutukset

Yleiset:

Uneliaisuus, uupumus, heitehuimaus, nuha (lapsilla), päänsärky, nielutulehdus, ripuli, pahoinvointi ja suun kuivuminen.

